



**INSTITUTI KOMBËTAR I SHËNDETËSISË  
PUBLIKE TË KOSOVËS**


**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
OF KOSOVA**



**SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE ME INFLUENCË, COVID-19 DHE  
PATOGENËT TJERË RESPIRATORË NË KOSOVË,  
SEZONA 2024/2025 (JAVA 09-TË)**

**Simptomet e Gripit përfshijnë:**

- Temperaturë/ethe
- Kokëdhimbje
- Lodhje
- Kollë e thatë
- Dhimbje fyti
- Rrjedhje hundësh
- Dhimbje muskulare
- Simptome gastrointestinale, si nauze dhe barkqitje




**PËRMBLEDHJE**

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë tërë vitit bën mbikëqyrjen permanente të Influcencës sezonale (ILI), ARI dhe SARI me intensifikim të aktiviteteve gjatë sezonës përkatëse. Mbikëqyrja realizohet përmes hulumtimit aktiv dhe pasiv në institucione shëndetësore dhe terren.

**SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE ME INFLUENCËN SEZONALE NË KOSOVË, 2020/2021 -  
2024/2025**

Sipas grafikonit 1, ku janë paraqitur rastet e Influcencës sezonale (ILI) në 5 sezonat e fundit shohim se sezona 2024/2025 karakterizohet me numër më të lartë të rasteve të raportura, krahasuar me periudhën e njejtë të sezonës 2023/2024 dhe fillim të aktivitetit nga java e 40-të, 2024/2025 (Graf. 1).

Grafikoni.1




**SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE ME INFLUENCËN SEZONALE NË KOSOVË, 2024/2025 DHE PRAGU EPIDEMIK**

Nga fillimi i sezonës, 30 shtator 2024 deri më 02 mars 2025 (java e 9-të) në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës janë raportuar 86,405 raste të Sëmundjes të ngjashme me Grip (ILI), 8,495 raste të Infeksioneve respiratore akute (ARI) dhe 116 raste me Infeksion të rëndë respirator akut (SARI).

Gjatë javës së 9-të (24.02.2025-02.03.2025) janë raportuar 4,746 raste ILI (Sëmundje e Ngjashme me Gripin), 349 raste ARI (Infeksion Respirator Akut) dhe 7 raste me SARI (Infeksion i Rëndë Akut Respirator).


**Intensiteti i Influencës sezonale sipas numrit të rasteve të raportuara për javën e 9-të paraqitet në aktivitetin e mesëm të lartë të qarkullimit dhe krahasur me javën e kaluar shënon një rënie për 2.14%. (Graf.2)**


Grafikoni.2



Në grafikoni 3 shohim se në të gjitha komunat janë raportuar raste të dyshimta në Influencë dhe sipas numrit të rasteve të raportuara, numër më të lartë kanë komuna e Prishtinës, Prizrenit dhe Gjilanit ndërsa sipas Incidencës numër më të lartë të rasteve kanë komuna e Prishtinës dhe Kamenicës. (Graf.3).


Grafikoni.3





Në raport me distribuimin e rasteve sipas grup-moshës dhe incidencës, nga numri total i rasteve të raportuara me ILI, shihet se të gjitha grup-moshat janë të atakuara derisa sipas Incidencës; grup-mosha 0-4 dhe mbi 65 vjeç (Graph.4). Sa i përket rasteve me ARI, grup-mosha më e atakuar është 0-4 vjeç (3,613 raste) pastaj grup-mosha 15-64 vjeç (2,680 raste), 5-14 vjeç (1,365 raste) dhe grup-mosha 65+ vjeç (837 raste). (Graf.4)

Grafikoni.4



## MBIKËQYRJA VIROLOGJIKE

Në laboratorin e Qendrës Kombëtare të Influcencës – IKSHPK nga fillimi i sezonës 2024/2025 deri me 05 mars 2025, janë testuar gjithsej 4,406 mostra nga pacientët e qendrave sentinel dhe jo sentinel si raste të dyshimta në ILI, ARI dhe SARI. Nga mostrat e testuara 2,205 (50.04%) prej tyre të dyshimta në SARS-CoV-2 dhe 2,201 (49.95%) të dyshimta në Influcencë dhe patogjenët tjerë respiratorë. Gjatë kësaj periudhe në SARS-CoV-2 janë konfirmuar 17 raste (0.77%), ku 4 prej tyre janë raportuar gjatë javës së 9-të, 2025.


Nga 2,201 mostrat e testuara në Influcencë dhe patogjenët tjerë respiratorë janë konfirmuar 720 raste me Influcencë A dhe B (pozitiviteti 32.71 %). Sipas tipit: me Influcencë A (353 raste apo 16.03%) dhe Influcencë B (367 raste apo 16.67%). Nga 720 rastet e konfirmuara me Influcencë A dhe B, sipas komunave: Mitrovicë (220 raste), Prishtinë (213 raste), Fushë Kosovë (45 raste), Podujevë (26 raste), Vushtrri (25 raste), Lipjan (24 raste), Malishevë (22 raste), Drenas (20 raste), Pejë (19 raste), Ferizaj (19 raste), Obiliq (15 raste), Skenderaj (14 raste), Prizren (10 raste), Suharekë (9 raste), Gjilan (7 raste), Gjakovë (5 raste), Shtime (5 raste), Rahovec (5 raste), Klinë (5 raste), Viti (5 raste), Hani i Elezit (3 raste), Istog (2 raste) dhe me nga një rast komuna e Dragashit dhe Deçanit, kurse sipas grup-moshës: 0-4 vjeç (276 raste), 5-14 vjeç (202 raste), 15-29 vjeç (90 raste), 30-44 vjeç (50 raste), 45-60 vjeç (53 raste) dhe 60+ (49 raste).

Gjatë javës së nëntë (24.02.2025-02.03.2025), nga labororet private janë raportuar gjithsej 30 mostra të testuara si të dyshimta në SARS-CoV-2. Nga këto mostra nuk është konfirmuar asnjë rast pozitiv.

Nga patogjenët tjerë respiratorë, janë konfirmuar: 175 mostra me RSV, 156 mostra me Human Rhinovirus, 92 mostra me Human Adenovirus, 22 mostra Metapneumovirus dhe 10 mostra me Parainfluenza Virus.


Nga 174 rastet pozitive në RSV (7.95%): 151 (86.28%) prej tyre i takojnë grup-moshës 0-4 vjeç, 13 raste i takojnë grup-moshës 5-14 vjeç, 15-34 vjeç (3 raste), 35-50 vjeç (1 rast), 51-64 vjeç (2 raste) dhe 65+ vjeç (5 raste), kurse sipas komunave: Prishtinë (70 raste), Fushë Kosovë (16 raste), Podujevë (16 raste), Vushtrri (11 raste), Drenas (9 raste), Ferizaj (6 raste), Malishevë (6 raste), Obiliq (5 raste), Gjilan (4 raste), Shtime (4 raste), Klinë (4 raste), Kaçanik (4 raste), Lipjan (4 raste), Mitrovicë (4 raste), Pejë (4 raste), Suharekë (3 raste), Gjakovë (2 raste) dhe me nga 1 rast komunat : Deçan, Prizren dhe Skenderaj.

Grafikoni.5



Sipas subtipit: me Influcencë A të pasubtipizuar janë 318 raste (44%), me subtipin AH3 janë 30 raste (4%), me subtipin AH1N1 janë 5 raste (1%), Influcencë B të pasubtipizur janë 358 raste (50%) dhe Influcencë B Victoria 9 raste (1 %).

Grafikoni.6



## AKTIVITETET SEZONALE

IKSHPK/Departamenti i Epidemiologjisë bënë mbikëqyrjen e Influencës gjatë tërë vitit, me intensifikim të saj gjatë sezonës përkatëse (java e 40 deri në javën e 20).

Përcjell situatën epidemiologjike me rastet ILI/ARI (javore) dhe rastet me SARI (në bazë ditore/alerti).

Bënë testimin laboratorik të mostrave në Departamentin e Mikrobiologjisë/Qendrën Kombëtare për Testimin e Influencës.

Instituti Kombëtar ka apeluar te të gjithë Drejtorët Rajonal të Shëndetësisë Publike dhe punëtorët shëndetësor që të ngrisin nivelin e vigjilencës dhe raportimit të rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë.

Ka rekomanduar tek Inspektorati shëndetësor dhe sanitar të mbikëqyrë të gjitha Institucionet shëndetësore të Kosovës, për të urdhëruar për obligimin ligjor të paraqitjes së sëmundjeve ngjitëse dhe rasteve të vdekjeve nga këto sëmundje.

Ka dhënë këshilla për popullatën për mbrojtjen nga sëmundja dhe njohjen e simptomeve të saj.

## MASAT PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË VIRUSIT TË GRIPIT SEZONAL

Aktiviteti i gripit është në nivel të lartë krahasuar me sezonën paraprake dhe masat për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve respiratore janë:

Mbajtja e maskave.

Distanca fizike.

Higjiena e duarve.

Evitimi i kontakteve të afërta me individë të sëmurë.

Redukimi i vizitave të familjarëve tek personat e hospitalizuar (SHSKUK, Spitalet rajonale).

Evitimi i vendeve të mbyllura dhe të mbingarkuara me njerëz.

Ushqimi i shëndetshëm me shumë vitamina.

Aktiviteti fizik dhe gjumë i mjaftueshëm.

Personat e sëmurë të qëndrojnë në shtëpi.

- Pastrimi dhe dezinfektimi i mjediseve ku qëndroni.
- Mbulimi i hundës dhe gojës me një shami gjatë teshtitjes dhe kollitjes si dhe hudhja më pas në vend të sigurt.
- Larja e duarve shpesh me ujë dhe sapun, ose solucione duarsh me alkool.
- Sytë, hunda dhe goja të mos preket me duar të kontaminuar, pasi virusi përhapet në këtë mënyrë.
- Pastrimi dhe dezinfektimi i sipërfaqeve dhe objekteve që mund të jenë kontaminuar nga virusi.

**Konsultimi me mjekun për mjekimin me barna kundër gripit, të cilat duhet të merren vetëm me rekomandimin e mjekut**

Medikamentet kundër gripit duhet të fillohen brenda 48 orëve të para të fillimit të sëmundjes për të pasur efektivitet të lartë.

Ato mund të parandalojnë edhe komplikimet e rënda që mund të vijnë nga gripit.

Mënyra më efikase për parandalimin e virusit të gripit është Vaksinimi me vaksinën kundër gripit.

- Vaksinimi mbron vetë personin dhe ndihmon në parandalimin e përhapjes së gripit.
- Efekti i vaksinës fillon 1 deri 2 javë pas marrjes dhe mbrojtja vazhdon rreth një vit pas vaksinimit.

## VAKSINIMI

Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me IKSHPK në fillim të sezonës së gripit 2024/2025 ka siguruar 85,000 doza të vaksinës sezonale. Nga 30 shtatori 2024 deri me 05 mars 2025 janë administruar 66,830 doza. Prej tyre sipas grupeve të rrezikut: 44,773 janë administruar te grup-mosha mbi 65 vjeç, 20,541 me sëmundje kronike, 1,478 profesionistë shëndetësor, 3 gra shtatëzëna dhe 35 fëmijë (0-5 vjeç).

## HOSPITALIZIMET

Gjatë javës së fundit nga rastet e hospitalizuara në Klinikën Infektive, Klinikën e Pediatriisë dhe spitalet rajonale janë raportuar 38 raste me ARI, 15 raste me ILI, 7 raste me SARI dhe 1 rast me Influcencë B.

Nga Klinika Infektive përmes Sistemit të Mbikqyrjes së Sëmundjeve Ngjitetëse deri më 05 mars 2025, janë raportuar 4 raste të vdekjes me Influcencë A dhe 1 rast i vdekjes nga COVID-19. Të gjitha rastet janë të gjinisë mashkullore, i përkasin grup-moshës mbi 60 vjeç dhe me sëmundje kronike përcjellëse.

## SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE NË RAJON DHE EVROPË

### INFLUENCA SEZONALE JAVA 09/2025 NË EVROPË

Që nga java 40 e vitit 2024, sezoni dimëror i viruseve respiratorë në BE/EEA ka qenë i shoqëruar nga një sezon intensiv i gripit, një epidemi e virusit sincial (RSV) dhe një rënie e qëndrueshme e aktivitetit të SARS-CoV-2. Ndikimi më i madh në kujdesin sekondar është vënë re tek të rriturit mbi 65 vjeç për gripin dhe SARS-CoV-2 dhe tek fëmijët nën pesë vjeç për RSV.

Sipas të dhënave të raportuara deri në javën e 9-të të vitit 2025, nivelet e konsultimeve të kujdesit parësor dhe dytësor tregojnë se vazhdon të ketë nivele të konsiderueshme të aktivitetit të viruseve respiratore në BE/ZEE. Aktiviteti intensiv i gripit sezonal raportohet së bashku me një epidemi të virusit sincial respirator (RSV), ndërsa aktiviteti SARSCoV-2 është në nivel shumë të ulët. Vazhdon të ketë një rritje të aktivitetit të Influcencës B në disa tregues. Vizitat në qendrën emergjente për sëmundjet e ngjashme me gripin (ILI) janë ulur përgjithësisht. Që nga kulmi në javën 52 të vitit 2024, aktiviteti i RSV në BE/EEA ka rënë. Megjithatë, në nivel shtetëror, situata është e ndryshme, me rreth gjysmën e shteteve që raportojnë ulje të aktivitetit, ndërsa pjesa tjetër ka nivel të qëndrueshëm ose në rritje të aktivitetit.

Sipas të dhënave të raportuara në mbarë botën, aktiviteti i SARS-CoV-2 vazhdon të jetë i ulët, me disa përjashtime të aktiviteteve të ngritura të raportuara në disa pjesë të Amerikës Qendrore dhe Jugore, dhe Afrikës Lindore.

Vaksinimi është masa më efektive për të mbrojtur kundër formave të rënda të sëmundjeve virale respiratore. Ata që kanë të drejtë për vaksinim, veçanërisht ata me rrezik më të lartë për rezultate të rënda, inkurajohen të vaksinohen. Klinikistëve duhet t'u kujtohet se, përdorimi i hershëm i antiviralëve kundër gripit mund të parandalojë përparimin në sëmundje të rëndë për grupet e rrezikut. Ndërhyrjet jo farmaceutike si larja e shpeshtë e duarve, distancimi fizik dhe shmangia e tubimeve të mëdha mund të jenë gjithashtu të dobishme për kontrollin e epidemisë në vend. Mbajtja e maskave në mjediset e kujdesit shëndetësor gjatë pikut të sezonit të gripit mund të konsiderohet si një mënyrë për të reduktuar transmetimin tek personat me rrezik.

Burimi: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-9-2025.pdf>