




**INSTITUTI KOMBËTAR I SHËNDETËSISË
PUBLIKE TË KOSOVËS**



**SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE ME INFLUENCË, COVID-19 DHE
PATOGENËT TJERË RESPIRATORË NË KOSOVË, SEZONA
2025/2026 (JAVA 02-TË) – v.2**




PËRMBLEDHJE

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë tërë vitit bën mbikëqyrjen permanente të Influençës sezonale (ILI), ARI dhe SARI me intensifikim të aktiviteteve gjatë sezonës përkatëse. Mbikëqyrja realizohet përmes hulumtimit aktiv dhe pasiv në institucione shëndetësore dhe terren.

**SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE ME INFLUENCËN SEZONALE NË KOSOVË,
2021/2022 - 2025/2026**

Sipas grafikonit 1, ku janë paraqitur rastet e Influencës sezonale (ILI) në 5 sezonat e fundit shohim se sezona 2025/2026 karakterizohet me numër më të ulët të rasteve të raportura, krahasuar me periudhën e njëjtë të sezonës 2024/2025 dhe fillim të aktivitetit nga java e 40-të e sezonës 2025/2026.

Grafikoni.1



**SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE ME INFLUENCËN SEZONALE NË KOSOVË, 2025/2026
DHE PRAGU EPIDEMIK**

Nga fillimi i sezonës, 29 shtator 2025 deri më 11 janar 2026 (java e 02-të) në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës janë raportuar 32,740 raste të Sëmundjes të ngjashme me Grip (ILI), 5,149 raste të Infeksioneve respiratore akute (ARI) dhe 40 raste me Infeksion të rëndë respirator akut (SARI).

Gjatë javës së 02-të (05.01.2026-11.01.2026) janë raportuar 4,098 raste ILI (Sëmundje e Ngjashme me Gripin), 335 raste ARI (Infeksion Respirator Akut) dhe 3 raste SARI (Infeksion i Rëndë Akut Respirator).



Përmes sistemit të mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse dhe paralajmërimit të hershëm (SMSN) janë raportuar 518 raste ILI, 34 raste ARI dhe 3 SARI.

Intensiteti i Influcës sezonale sipas numrit të rasteve të raportuara për javën e 02-të paraqitet në aktivitetin e lartë të qarkullimit por krahasuar me javën e kaluar shënon rritje prej 16.5%. (Graf.2)

Grafikoni.2




Në grafikonin 3 shohim se në të gjitha komunat janë raportuar raste të dyshimta në Influcë dhe sipas numrit të rasteve të raportuara, numër më të lartë kanë komuna e Prishtinës, Mitrovicës, Pejës dhe Prizrenit ndërsa sipas Incidencës numër më të lartë të rasteve kanë komunat e Kamenicës dhe Mitrovicës. *Grafikoni.3*



Në raport me distribuimin e rasteve sipas grup-moshës dhe incidencës, nga numri total i rasteve të raportuara me ILI, shihet se të gjitha grup-moshat janë të atakuara derisa sipas Incidencës; grup-mosha 04 dhe mbi 65 vjeç. Sa i përket rasteve me ARI, grup-mosha më e atakuar është 0-4 vjeç (3,679 raste) pastaj grup-mosha 5-14 vjeç (650 raste), 15-64 vjeç (556 raste), dhe grup-mosha 65+ vjeç (264 raste). (Graf.4)

Grafikoni.4




MBIKËQYRJA VIROLOGJIKE

Në laboratorin e Qendrës Kombëtare të Influcencës – IKSHPK nga fillimi i sezonës 2025/2026 deri më 14 janar 2026, janë testuar gjithsej 2,731 mostra nga pacientët e qendrave sentinel dhe jo sentinel si raste të dyshimta në ILI, ARI dhe SARI. Nga mostrat e testuara 1,368 (50.1%) prej tyre të dyshimta në SARSCoV-2 dhe 1,363 (49.9%) të dyshimta në Influcencë dhe patogjenët tjerë respiratorë. Gjatë kësaj periudhe në SARS-CoV-2 janë konfirmuar 20 raste (1.5%). Nga 1,363 mostrat e testuara në Influcencë dhe patogjenët tjerë respiratorë janë konfirmuar 288 raste me Influcencë A (pozitiviteti 21.1%). Rastet e konfirmuara me Influcencë A janë nga komuna e Prishtinës (111 raste), Mitrovicë (55 raste), Fushë Kosovë (18 raste), Ferizaj (12 raste), Malishevë (11 raste), Podujevë (11 raste), Vushtri (9 raste), Lipjan (9 raste), Drenas (7 raste), Kaçanik (6 raste), Skenderaj (5 raste), Gjakovë (5 raste), Gjilan (4 raste), Pejë (3 raste), Suharekë (3 raste), Viti (3 raste), Shtime (3 raste), Klinë (2 raste), Rahovec (2 raste), Graçanicë (2 raste) dhe me nga 1 rast komunat : Kamenicë Novobërdë, Obiliq dhe Prizren, dhe i takojnë grup-moshës 0-4 vjeç (133 raste), 5-14 vjeç (75 raste), 15-34 vjeç (32 raste), 35-50 vjeç (13 raste), 51-64 vjeç (10 raste) dhe 65+ (25 raste). Gjatë javës së dytë (05.01.2026-11.01.2026), nga laboratoret private janë raportuar gjithsej 63 mostra të testuara si të dyshimta në SARS-CoV-2. Nga këto mostra nuk është konfirmuar asnjë rast pozitiv. Nga patogjenët tjerë respiratorë, janë konfirmuar: 167 mostra me RSV, 242 mostra me Human Rhinovirus, 129 mostra me Human Adenovirus, 27 mostra me Parainfluenza Virus dhe 9 mostra me Metapneumovirus (*Graf.5*).

Rastet pozitive në RSV (12.3%), janë nga komuna e Prishtinës (75 raste), Fushë Kosovë (24 raste), Ferizaj (15 raste), Podujevë (9 raste), Lipjan (5 raste), Malishevë (4 raste), Obiliq (3 raste), Viti (3 raste), Prizren (3 raste), Gjilan (3 raste), Mitrovicë (3 raste), Rahovec (2 raste), Vushtri (2 raste), Hani i Elezit (2 raste), Kaçanik (2 raste), Klinë (2 raste), Shtime (2 raste) dhe me nga 1 rast komuna: Deçan, Drenas, Graçanicë, Gjakovë, Istog, Suharekë, Novobërdë dhe Pejë. Rastet pozitive me RSV i takojnë grup-moshës 0-4 vjeç (146 raste), 5-14 (11 raste), 15-34 (4 raste), 35-50 (1 rast) dhe 65+ (5 raste) (*Graf.5*).

Grafikoni.5



Sipas subtipit: me subtipin AH3 janë konfirmuar 32 raste apo 11%, me subtipin AH1N1 janë konfirmuar 12 raste apo 4% dhe me Influcë A të pa subtipizuar janë konfirmuar 244 raste apo 85%.(Graf.6.)

Grafikoni. 6



AKTIVITETET SEZONALE

IKSHPK/Departamenti i Epidemiologjisë bënë mbikëqyrjen e Influcës gjatë tërë vitit, me intensifikim të saj gjatë sezonës përkatëse (java e 40 deri në javën e 20).

Përcjell situatën epidemiologjike me rastet ILI/ARI (javore) dhe rastet me SARI (në bazë ditore/alerti).

Bënë testimin laboratorik të mostrave në Departamentin e Mikrobiologjisë/Qendrën Kombëtare për Testimin e Influcës.

Ka dhënë këshilla për popullatën për mbrojtjen nga sëmundja dhe njohjen e simptomeve të saj.

MASAT PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË VIRUSIT TË GRIPIT SEZONAL

Aktiviteti i gripit për sezonën 2025/2026, është në nivel më të lartë krahasuar me sezonën paraprake dhe masat për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve respiratore janë:

Mbajtja e maskave.

Distanca fizike.

Higjiena e duarve.

Evitimi i kontakteve të afërta me individë të sëmurë.

Redukimi i vizitave të familjarëve tek personat e hospitalizuar (SHSKUK, Spitalet rajonale).

Evitimi i vendeve të mbyllura dhe të mbingarkuara me njerëz.

Ushqimi i shëndetshëm me shumë vitamina.

Aktiviteti fizik dhe gjumë i mjaftueshëm.

Personat e sëmurë të qëndrojnë në shtëpi.

- Pastrimi dhe dezinfektimi i mjediseve ku qëndroni.
- Mbulimi i hundës dhe gojës me një shami gjatë teshtitjes dhe kollitjes si dhe hudhja më pas në vend të sigurt.
- Larja e duarve shpesh me ujë dhe sapun, ose solucione duarsh me alkool.
- Sytë, hunda dhe goja të mos preket me duar të kontaminuar, pasi virusi përhapet në këtë mënyrë.
- Pastrimi dhe dezinfektimi i sipërfaqeve dhe objekteve që mund të jenë kontaminuar nga virusi.

Konsultimi me mjekun për mjekimin me barna kundër gripit, të cilat duhet të merren vetëm me rekomandimin e mjekut

Medikamentet kundër gripit duhet të fillohen brenda 48 orëve të para të fillimit të sëmundjes për të pasur efektivitet të lartë.

Ato mund të parandalojnë edhe komplikimet e rënda që mund të vijnë nga gripit.

Mënyra më efikase për parandalimin e virusit të gripit është Vaksinimi me vaksinën kundër gripit.

- Vaksinimi mbron vetë personin dhe ndihmon në parandalimin e përhapjes së gripit.
- Efekti i vaksinës fillon 1 deri 2 javë pas marrjes dhe mbrojtja vazhdon rreth një vit pas vaksinimit.

VAKSINIMI

Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me IKSHPK në fillim të sezonës së gripit 2025/2026 ka siguruar 85,000 doza të vaksinës sezonale dhe me fillimin e sezonës ka filluar vaksinimi sipas rekomandimeve. Deri më 31 dhjetor janë administruar gjithsej 66,314 doza të vaksinës kundër gripit sezonal. Prej tyre sipas grupeve të rrezikut: 44,347 janë administruar te grup-mosha mbi 65 vjeç, 20,142 me sëmundje kronike, 1,287 profesionistë shëndetësor, 6 gra shtatëzëna, 49 fëmijë (0-5 vjeç), 195 zyrtarë policorë dhe 30 mësimdhënës dhe të tjerë 258.

HOSPITALIZIMET

Gjatë javës së fundit nga rastet e hospitalizuara në Klinikën Infektive, Klinikën e Pediatriisë dhe spitalet rajonale janë raportuar 35 raste me ARI, 13 raste me ILI, 3 raste me SARI dhe 1 rast me Influcencë A.

Nga Klinika Infektive deri më 11 janar 2026, janë raportuar 2 raste të vdekjes me Influcencë A. Një nga rastet është e gjinisë femërore dhe tjetri i gjinisë mashkullore; i përkasin grup-moshës mbi 65 vjeç dhe me sëmundje kronike përcjellëse.

SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE NË RAJON DHE EVROPË

INFLUENCA SEZONALE JAVA 02/2026 NË EVROPË

Gjatë javës raportuese, në shumicën e vendeve të Rajonit Evropian, normat e sëmundjes së ngjashme me gripin (ILI) dhe të infeksioneve akute respiratore (ARI) mbeten mbi nivelet bazë, duke reflektuar aktivitet të lartë dhe të përhapur të viruseve respiratore. Aktiviteti i Influcencës në nivel rajonal vijon të jetë i lartë, me personat mbi 65 vjeç që përbëjnë pjesën më të madhe të hospitalizimeve. Influcenca e tipit A(H3) mbetet virusi dominues në qarkullim, megjithëse vazhdon edhe qarkullimi i A(H1)pdm09 në përqindje më të ulëta. Treguesit e aktivitetit të SARS-CoV-2 kanë rënë në nivelet bazë dhe pozitiviteti mbetet i ulët në krahasim me Influcencën. Ndërkohë, aktiviteti i RSV-së ka shënuar një rritje graduale, veçanërisht në kujdesin parësor, me barrën më të madhe të rasteve tek fëmijët nën moshën 5 vjeç, por pa arritur nivele alarmante. Të dhënat nga mbikëqyrja spitalore tregojnë pozitivitet të qëndrueshëm për Influcencën dhe ndryshime të kufizuara në hospitalizime dhe hospitalizimet në mjekimin intensiv. Vdekshmëria nga COVID-19 dhe vdekshmëria nga të gjitha shkaqet mbeten në nivele të pritshme për këtë periudhë, pa sinjale për tejkalim të normave historike. Karakterizimi virologjik konfirmon dominimin e Influcencës A(H3) gjatë këtij sezoni, ndërsa prania e Influcencës B është shumë e kufizuar. Rekomandimet e OBSH-së për përbërjen e vaksinës për sezonin 2025/2026 pasqyrojnë situatën aktuale virologjike. Sa i përket SARS-CoV-2, varianti XFG vijon të jetë linja mbizotëruese e raportuar në Rajonin Evropian. Në tërësi, situata epidemiologjike karakterizohet nga një sezon i theksuar i Influcencës, me ndikim më të madh tek fëmijët dhe të moshuarit, ndërkohë që aktiviteti i SARS-CoV-2 mbetet i ulët dhe RSV po rritet gradualisht. Burimi: erviss.org